

I. Dosage des marqueurs: Bilan Initial

<i>Organe</i>	<i>Marqueur</i>	<i>Dépistage</i>	<i>Diagnostic</i>	<i>Pronostic</i>
Col de l'utérus	SCC	non	pour les carcinomes épidermoïdes	non
Colon-Rectum	ACE	non	Bilan initial	oui dans les formes métastatiques
Endomètre	CA 125	non	si atteinte ovarienne, suspicion d'extension régionale ou type 2 histologique	non
Foie	Alfa Foeto Protéine	oui	oui	oui
LLC	Béta 2 micro globuline	non	non	oui
Lymphome de Hodgkin	LDH, Albumine	non	non	oui si formes disséminées
Mélanome	LDH	non	non	oui si forme métastatique
Môle hydatiforme	hCG totale sérique	non	oui	non
Myélome multiple	protéines totales, EPPS, immunofixation des protéines sériques, protéinurie des 24 heures	non	oui	oui (pic monoclonal sur l'EPPS), albumine
	Béta 2 micro globuline	non	non	oui
Ovaire	CA 125	non	oui	non
	CA 19-9, ACE: si tumeur mucineuse	non	oui	non
Ovaire: tumeur germinale maligne	Alfa Foeto-Protéine, Béta HCG, LDH	non	oui	non
Ovaire: tumeur des cordons sexuels: de la granulosa	Inhibine B, AMH, estradiolémie	non	oui	non
Ovaire: tumeur des cordons sexuels: Sertoli et Leydig	testostérone, delta 4 androstènedione	non	oui	non
Pancréas	CA 19-9	non	avant chirurgie	non
Prostate	PSA total	Individuel après évaluation du rapport bénéfice risque, annuel	Oui	oui, classification de D'Amico
Sein	CA 15-3	non	à discuter au cas par cas si points d'appels métastatiques	non
Testicule	LDH, Béta HCG, Alfa Foeto Protéine	non	Oui	oui
Nodule thyroïde	Calcitonine, TSH	non	Oui	
Thyroïde, forme médullaire	ACE, Calcitonine	Oui si NEM 2	Oui + métanéphrines urinaires et/ou plasmatiques, calcémie et parathormone à la recherche d'une NEM 2	oui
Thyroïde, forme folliculaire	Thyroglobuline, Anticorps anti-thyroglobuline, TSH, T4, T3 libre	non	non	Thyroglobuline, anticorps anti Tg
Tumeurs trophoblastiques gestationnelles	hCG totale sérique	non	oui	oui (FIGO 2000)
Vessie	PSA total	non	Bilan initial	non