

COMMENT PRENDRE MON TRAITEMENT ?



Votre traitement doit être pris :

- Le matin à jeun avec une boisson
- Boire un grand verre d'eau immédiatement après



EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENTS, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- Ignorez la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure habituelle
- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

RECOMMANDATIONS GENERALES



Buvez beaucoup d'eau alcalinisée type Vichy (au moins 1,5L par jour)



Ce médicament est à conserver à l'abri de la lumière.



Ce médicament est à conserver à une température <25°C.



Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement, et 3 à 6 mois après l'arrêt. Faites un test de grossesse avant le début du traitement. En cas de doute, parlez-en à votre médecin.



Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de l'allaitement.



Ne jetez pas vos médicaments à la poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques d'infections.



La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée.



En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes



Pensez à toujours emporter vos médicaments et vos ordonnances lors de vos voyages.



Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-en à votre médecin.



Nécessite une surveillance biologique.



Ne manipulez pas ce médicament directement avec les doigts, portez des gants.



Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes (millepertuis) ou tisanes. Evitez l'automédication.



Il est déconseillé de manger ou boire du pamplemousse lors du traitement.



Ne pas laisser vos médicaments à la portée

Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..) 

.....

ONCO
 HAUTS-DE-FRANCE
 RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE



FICHE CONSEIL PATIENT

CYCLOPHOSPHAMIDE

Endoxan

Version 2017

Cette fiche a été délivrée par :

.....

 ..

Version issue des travaux des professionnels de l'ex-Nord-Pas-de-Calais

Ce document ne peut se substituer à un avis médical.
 En cas de doute, demandez conseils à votre équipe soignante.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES



Symptômes généraux

Se manifestent par de la fièvre, des frissons, une toux, des maux de gorge, ...

COMMENT PREVENIR ?

- Limitez les contacts avec des personnes malades ou contagieuses
- Lavez vous les mains régulièrement

QUE FAIRE ?

- Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez immédiatement votre médecin traitant si la température est supérieure à 38°.



Brûlure urinaire / Cystite hémorragique

Se manifestent par une difficulté à uriner, présence de sang dans les urines

COMMENT PREVENIR ?

- Boire beaucoup d'eau alcalinisée type Vichy

QUE FAIRE ?

- En cas d'apparition des signes évoqués, contactez votre médecin



Neutropénie / Risque d'infection

Les signes d'infection sont liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang (neutropénie). Ils se manifestent par de la fièvre, des frissons, une toux, des maux de gorge, des brûlures urinaires, etc.

COMMENT PREVENIR ?

- Ayez une bonne hygiène corporelle
- Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses
- Lavez-vous fréquemment les mains
- Désinfectez soigneusement toute plaie éventuelle

QUE FAIRE ?

- Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre température dépasse 38°C



Mucites / Aphtes

Se manifestent par des aphtes ou des ulcérations sur la bouche ou sur les lèvres

COMMENT PREVENIR ?

- Evitez alcool/tabac
- Evitez les aliments trop chauds, épicés ou acides, les fruits secs, le gruyère, la moutarde
- Evitez les aliments trop sucrés (miel, confiture ...) ainsi que les fritures
- Préservez une bonne hygiène buccale, utilisez une brosse à dent souple

QUE FAIRE ?

- Des bains de bouche peuvent vous être prescrits
- Le froid soulage les aphtes (glaçons, glaces, boissons rafraichissantes, etc.)



Nausées / Vomissements

COMMENT PREVENIR ?

- Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais fréquemment. Essayez de nouveaux aliments.
- N'hésitez pas à fractionner vos repas: collation, goûter...
- Evitez les aliments gras, frits, épicés difficiles à digérer, limitez la consommation d'alcool.
- Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants.

QUE FAIRE ?

- Si vous vomissez, rincez-vous la bouche et attendez une heure ou deux avant de manger.
- Un médicament anti-vomissements peut vous être prescrit par votre médecin.
- Si les vomissements persistent malgré le traitement, n'hésitez pas à prévenir votre médecin traitant
- Evitez la position allongée
- En cas de vomissements, continuez à prendre votre traitement normalement.



Réaction allergique

Se manifeste par fièvre, frissons, démangeaisons, fatigue, migraine, baisse de tension, essoufflement, éruptions cutanées.

COMMENT PREVENIR ?

- Surveillance pendant et après le traitement
- Des médicaments anti-allergiques peuvent être prescrits

QUE FAIRE ?

- Au moindre doute, prévenez immédiatement l'équipe médicale



Troubles respiratoires

Se manifestent par une difficulté à respirer, une toux sèche rebelle

QUE FAIRE ?

- En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler rapidement à votre médecin qui procédera à un examen approfondi.



Fatigue

COMMENT PREVENIR ?

- Privilégiez les activités qui vous font plaisir.
- Continuez vos activités quotidiennes tout en vous aménageant des pauses dans la journée
- Relaxe vous autant que possible (sieste)

QUE FAIRE ?

- Demandez de l'aide si besoin à votre entourage, à l'assistante sociale, à votre mutuelle, à l'équipe soignante: des aides sont possibles.
- Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin traitant

Cette liste n'est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité. Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l'apparition de ces effets.