

QUAND ET COMMENT AURAI- JE MON TRAITEMENT ?

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*). Ce traitement sera administrée sous forme de cycles (ou cures)



Description synthétique du schéma thérapeutique:
→ Ce traitement ne nécessite pas une hospitalisation complète. Il vous sera administré en hôpital de jour.

Cycle de 15 jours



Bilan sanguin

Bilan sanguin

Cycle de 21 jours



Bilan sanguin

Bilan sanguin

Avant et après les cures, Que dois- je faire?

- Prémédication avant les cures (patch Emla (lidocaïne))
- Dans les jours précédant la cure, vous devrez réaliser un bilan sanguin.
- Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques et de votre état clinique.
- Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.
- Un contrôle urinaire vous sera demandé à votre arrivée.

*Abord veineux (PAC)

Un petit boîtier, situé sous la clavicule, appelé communément PAC ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien avant de débiter le traitement.

En cas d'apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce niveau, en parler à votre médecin.

RECOMMANDATIONS GENERALES



Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5L par jour)



Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de



Lors du traitement, il est déconseillé de



Le traitement peut entraîner des troubles sexuels. Parlez-en à votre médecin ou à l'équipe soignante.



La consommation d'alcool et de tabac est fortement



Si vous prenez de l'Aprépitant (Emend), il est déconseillé de manger ou boire du pamplemousse



Il est conseillé de faire de l'activité



En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes



Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques



Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement. En cas de doute, parlez-en à




Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-



Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes ou tisanes. Evitez



Conservez vos activités tout en vous ménageant (pauses,



FICHE CONSEIL PATIENT

BEVACIZUMAB Avastin

Ce traitement n'est pas une chimiothérapie mais un antiangiogénique. La chimiothérapie s'attaque directement à la tumeur, tandis que le Bevacizumab s'attaque aux vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur.

Ce traitement peut être administré seul ou associé

Version 2017

Cette fiche a été délivrée par :

.....
.....
.....
.....

Version issue des travaux des professionnels de l'ex Nord-Pas-de-Calais

Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..)

.....
.....
.....



Retard de cicatrisation des plaies

COMMENT PREVENIR ?

→ Programmer toute intervention prévue au minimum 3 semaines à 1 mois après le traitement par Avastin.

QUE FAIRE ?

→ En cas d'intervention en urgence, prévenir vos professionnels de santé de votre traitement (dentiste, chirurgien, ophtalmologue, etc.)



Toxicité rénale

Se manifeste par des gonflements, des tiraillements, des lourdeurs des membres, etc.

COMMENT PREVENIR ?

→ Hydratation

→ Surveillance de l'élimination des urines

QUE FAIRE ?

→ Une analyse d'urine sera effectuée avant chaque perfusion



Hypertension

se manifeste par une augmentation de votre tension artérielle, maux de tête, sensation de vertige, palpitations, bourdonnements d'oreille

COMMENT PREVENIR ?

→ Votre tension artérielle et vos pulsations seront surveillées avant et après le passage de la perfusion

→ Dormez la tête surélevée avec un oreiller par exemple

→ Limitez votre consommation de sel

QUE FAIRE ?

→ En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin



Saignements

Souvent peu abondants mais fréquents (nez, gencives lors du brossage des dents, etc.)

QUE FAIRE ?

→ Si des saignements apparaissent au niveau de la bouche, des selles ou des urines ou en cas de douleurs abdominales importantes, consultez votre médecin.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.

Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l'apparition de ces effets.

EN CAS DE PERSISTANCE DE L'UN DE CES EFFETS INDESIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.