



BEVACIZUMAB

Avastin

Ce traitement n'est pas une chimiothérapie mais un antiangiogénique. La chimiothérapie s'attaque directement à la tumeur, tandis que le Bevacizumab s'attaque aux vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur. Ce traitement peut être administré seul ou associé.

Août 2019

Quand et comment aurai-je mon traitement ?

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*).

Ce traitement sera administré sous forme de cycles (ou cures)

Description synthétique du schéma thérapeutique :

Ce traitement ne nécessite pas une hospitalisation complète. Il vous sera administré en hôpital de jour.

* ABORD VEINEUX (PAC)

Un Petit boîtier, situé sous la clavicule, appelé communément PAC ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien avant de débiter le traitement. En cas d'apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce niveau, en parler à votre médecin.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5L par jour)



Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de l'allaitement.



En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes sous traitement.



Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes ou tisanes. Evitez l'automédication.



Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-en à votre médecin.



Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques d'infections.



Il est conseillé de faire de l'activité physique.



La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée.



Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement. En cas de doute, parlez-en à votre médecin.



Conserver vos activités tout en vous ménageant (pauses, siestes).



Lors du traitement, il est déconseillé de s'exposer au soleil.



Le traitement peut entraîner des troubles sexuels. Parlez-en à votre médecin ou à l'équipe soignante.




Si vous prenez de l'Aprépitant (Emend), il est déconseillé de manger ou boire du pamplemousse lors du traitement.

SCHEMA D'ADMINISTRATION

Cycle de 21 jours



Cycle de 15 jours



AVANT ET APRES LES CURES, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- ✓ Prémédication avant les cures (patch Emla (lidocaïne))
- ✓ Dans les jours précédant la cure, vous devrez réaliser un bilan sanguin.
- ✓ Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques et de votre état clinique.
- ✓ Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.
- ✓ Un contrôle urinaire vous sera demandé à votre arrivée. Parfois des injections de facteurs de croissance des globules blancs ou des globules rouges peuvent vous être prescrits à la suite de la cure.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES



Toxicité rénale

Se manifeste par des gonflements, des tiraillements, des lourdeurs des membres, etc.

COMMENT PREVENIR ?

- Hydratation
- Surveillance de l'élimination des urines

QUE FAIRE ?

- Une analyse d'urine sera effectuée avant chaque perfusion



Hypertension

Se manifeste par une augmentation de votre tension artérielle, maux de tête, sensation de vertige, palpitations, bourdonnements d'oreille

COMMENT PREVENIR ?

- Votre tension artérielle et vos pulsations seront surveillées avant et après le passage de la perfusion.
- Dormez la tête surélevée avec un oreiller par exemple
- Limitez votre consommation de sel

QUE FAIRE ?

- En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin



Retard de cicatrisation des plaies

COMMENT PREVENIR ?

- Programmer toute intervention prévue au minimum 3 semaines à 1 mois après le traitement par Avastin.

QUE FAIRE ?

- En cas d'intervention en urgence, prévenir vos professionnels de santé de votre traitement (dentiste, chirurgien, ophtalmologue, etc.)



Saignements

Souvent peu abondants mais fréquents (nez, gencives lors du brossage des dents, etc.)

QUE FAIRE ?

- Si des saignements apparaissent au niveau de la bouche, des selles ou des urines ou en cas de douleurs abdominales importantes, consultez votre médecin.