

ATEZOLIZUMAB

Tecentriq

Mai 2020

Quand et comment aurai-je mon traitement ?

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*).

Ce traitement n'est pas une chimiothérapie mais une immunothérapie. Il vous sera administré sous forme de cycles (ou cures).

Il vous sera administré en hôpital de jour.

*ABORD VEINEUX (PAC)

Un petit boîtier, situé sous la clavicule, appelé communément PAC ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien avant de débuter le traitement. En cas d'apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce niveau, en parler à votre médecin.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes ou tisanes.
Evitez l'automédication.



Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de l'allaitement.



En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes sous traitement.



Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-en à votre médecin.



Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques d'infections.



Le traitement peut entraîner des troubles sexuels. Parlez-en à votre médecin ou à l'équipe soignante.



La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée.



Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement. En cas de doute, parlez-en à votre médecin.



Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5L par jour)



Préservez vos activités tout en vous ménageant (pauses, siestes) afin de limiter la fatigue.



Il est conseillé de faire de l'activité physique.



Lors du traitement, il est déconseillé de s'exposer au soleil.



Il est déconseillé de manger ou boire du pamplemousse lors du traitement.

SCHEMA D'ADMINISTRATION

Cycle de 21 jours
(J22=J1)



Le schéma thérapeutique peut être modifié sur prescription médicale.

AVANT ET APRES LES CURES, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- ✓ Prémédication avant les cures (patch Emla (lidocaïne), ...)
- ✓ Dans les jours précédant la cure, un bilan sanguin vous sera prescrit.
- ✓ Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques et de votre état clinique.
- ✓ Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.
- ✓ Ne prendre aucun traitement sans l'avis de votre spécialiste, notamment pour les corticoïdes.
- ✓ Garder toujours sur vous la carte de signalement qui vous a été remise.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES



Trouble de la fonction rénale

Se manifeste par des modifications du bilan biologique et dans de très rares cas par une impossibilité à uriner.

COMMENT PREVENIR ?

- ➔ Hydratation
- ➔ Surveillance de l'élimination des urines

QUE FAIRE ?

- ➔ Effectuez des prises de sang régulièrement comme prescrit par votre médecin



Douleurs articulaires et musculaires (crampes)

QUE FAIRE ?

- ➔ Buvez beaucoup d'eau. Un traitement contre la douleur peut être prescrit pour vous soulager.



Toxicité pulmonaire

Se manifeste par une toux, un essoufflement.

QUE FAIRE ?

- ➔ En cas d'apparition des signes évoqués, contactez votre médecin.
- ➔ Une radio pulmonaire peut vous être prescrite.



Trouble de la fonction du foie

Se manifeste par un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, des douleurs au niveau du côté droit du ventre, fatigue et nausées.

QUE FAIRE ?

- ➔ En cas d'apparition des signes évoqués, contactez votre médecin.
- ➔ Surveillance régulière de la prise de sang.



Troubles hématologiques

Anémie: fatigue, pâleur. Baisse du nombre de globules rouges dans le sang (du taux d'hémoglobine).

Thrombopénie: risque de saignement. Baisse du nombre de plaquettes sanguines

Neutropénie: risque d'infection (fièvre, frissons, etc.). Baisse du nombre de globules blancs dans le sang.

COMMENT PREVENIR ?

- ➔ Ayez une bonne hygiène corporelle
- ➔ Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses
- ➔ Lavez-vous fréquemment les mains

QUE FAIRE ?

- ➔ Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant **si votre température dépasse 38°C**
- ➔ En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez immédiatement le signaler à votre médecin.



Troubles endocriniens

Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète.

QUE FAIRE ?

- ➔ Surveillance régulière de vos prises de sang.
- ➔ Votre médecin pourra vous prescrire des médicaments pour empêcher l'aggravation de ces troubles et vous permettre de continuer le traitement.



Diarrhée

Se manifeste par une élimination fréquente de selles molles ou liquides, au moins 3 épisodes par jour.

Cela peut s'accompagner de douleurs abdominales.

COMMENT PREVENIR ?

- ➔ Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine ou du guarana
- ➔ Evitez les fruits, les légumes crus, les laitages, les aliments gras et épicés
- ➔ Privilégiez une alimentation pauvre en fibres : riz blanc, pâtes, pommes de terre, semoule, carotte cuites, gelée de coing, pain blanc, biscuits.

QUE FAIRE ?

- ➔ Buvez 2 litres par jour mais en petite quantité : thé, eau, boissons gazeuses
- ➔ En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez votre médecin qui vous prescrira un traitement adapté.



Rash cutané

Se manifeste par une éruption ressemblant à de l'acné au niveau du visage et/ou de la partie supérieure du corps qui apparaît 1 à 3 semaines après le début du traitement. Peut être associé à des démargeaisons ou rougeur et/ou sécheresse cutanée importante ainsi qu'à des fissures sur le bout des doigts et au niveau des talons.

COMMENT PREVENIR ?

- ➔ Utilisez des produits sans savon pour la toilette
- ➔ Hydratez votre peau avec des crèmes émollientes
- ➔ Préférez un maquillage sans parfum, hypoallergénique, spécial peau sensible
- ➔ Préférez une méthode de rasage et d'épilation non agressive (rasage électrique, crème dépilatoire)
- ➔ Evitez l'exposition au soleil : vêtements et crème solaire indice 50+

QUE FAIRE ?

- ➔ En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez immédiatement votre médecin

Cette liste n'est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.

Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l'apparition de ces effets.

EN CAS DE PERSISTANCE DE L'UN DE CES EFFETS INDESIRABLES CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU EQUIPE SOIGNANTE