


NEWSLETTER

Recherche clinique en cancérologie

StARCC 59-62
CLIP² Lille



Répartition des inclusions en 2020



2550 nouveaux patients *
- 3% par rapport à 2019

dont **352** en phases précoces (CLIP² Lille)
- 9% par rapport à 2019



338 études actives *

dont **102** en phases précoces (CLIP² Lille)

* Recherche Impliquant la Personne Humaine (RIPH1, 2, 3) comptabilisant au minimum une inclusion en 2020

Etudes interventionnelles - établissements StARCC 59-62

Découvrez la page CLIP² sur le site internet d'Alliance Cancer : <https://www.alliance-cancer.org/clip> avec la nouvelle procédure de transmission des fiches sans anonymisation au réseau d'adressage inter-régional.

Autres Événements à venir

- Participez à la [2ème Journée Recherche Translationnelle CNO-CLIP² Lille et normand](#) le 19 novembre 2021 à Abbeville. Programme complet et inscription [ici](#)
- Cliquez [ici](#) pour vous inscrire à nos prochaines formations : *Stratégies thérapeutiques en oncologie* (VADS, gynécologie,...)

Etudes interventionnelles nouvellement ouvertes



Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder

Dermatologie

Pathologies digestives

Endocrinologie

Pédiatrie

Gynécologie

Pneumologie

Hématologie

Sénologie

Neurologie

Urologie

ORL

Autres localisations

« Toute avancée des connaissances génère autant d'interrogations qu'elle apporte de réponses. »

Pierre Joliot-Curie

CLIP² Lille

Contact : aurore.acroute@chru-lille.fr

StARCC 59-62

Contact : maud.pouwels@chru-lille.fr



Vous pouvez à tout moment vous abonner ou vous désinscrire de cette newsletter en contactant Aurore Acroute ou Maud Pouwels. Sans désinscription de votre part, nous vous informons que votre adresse email n'est utilisée que pour vous adresser des newsletters et ne sera jamais communiquée à un tiers.



Dermatologie

Pas de nouvelles études sur la période



Endocrinologie

Pas de nouvelles études sur la période



Gynécologie



- AGO-OVAR 2.29 -

« Etude de phase III, randomisée, en double-aveugle comparant l’atezolizumab versus placebo combiné au bevacizumab et à la chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine, en rechute résistante au platine »

- PORTEC-4a -

« Etude randomisée de phase III comparant pour le traitement adjuvant des patientes opérées pour cancers de l’endomètre de stade précoce une approche basée sur des recommandations standard ou sur un profilage moléculaire »



Hématologie



Myélome

- GCT3014-01 -

« An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody®-CD38) in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies »

- IFM2020-05 / BENEFIT -

« A Phase 1b, Open-Label Study of Eftozanermin Alfa (ABBV-621) in Combination With Bortezomib and Dexamethasone in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma »

- ISB 1342-101 -

« A Phase 1, First-in-Human, Multicenter, Open-Label, Two-Part Dose-Escalation and Cohort Expansion Study of Single-Agent ISB 1342 in Subjects With Previously Treated Multiple Myeloma»

Leucémie

- EWALL-Ph-03 -

« Etude de phase II randomisée à 3 bras en ouvert, comparant la sécurité et l’efficacité du Ponatinib soit en combinaison avec la chimiothérapie ou en combinaison avec le Blinatumomab et de l’Imatinib en combinaison avec la chimiothérapie chez les patients âgés de 55 ans et plus atteints de leucémie aigue lymphoblastique associée au chromosome de Philadelphie (Ph+) ou BCR-ABL positive»

- TL-895-203 -

« Etude ouverte, multicentrique, de phase 1b / 2 sur l’innocuité et l’efficacité du TL-895 associé au KRT-232 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM) en rechute / réfractaire (R / R) FLT3 +»

- VIALE-M / M19-708 -

« Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert, à 2 bras, comparant le vénétoclax et l’azacitidine aux meilleurs soins de support dans le traitement d’entretien de la leucémie myéloïde aiguë en première rémission après une chimiothérapie conventionnelle (VIALE-M) »

Autres hémopathies malignes

- TRANSFORM-1 / M16-191 -

« Étude de phase III randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo sur le navitoclax associé au ruxolitinib versus ruxolitinib chez des patients atteints de myélofibrose »



Neurologie

Pas de nouvelles études sur la période



ORL



- CURVE -

« Étude prospective multicentrique randomisée comparant la reconstruction mandibulaire par lambeau libre de fibula avec ou sans planification virtuelle préopératoire chez les patients atteints d’un cancer de la cavité buccale ou de l’oropharynx»



Pathologies digestives



Cancers œsogastriques

- GASPAR -

« Traitement périopératoire dans le cancer gastrique résécable associant Spartalizumab (PDR001) avec fluorouracil, leucovorine, oxaliplatine, et docetaxel (FLOT) : étude de phase II »

Cancers colorectaux

- COLONPREP -

« Préparation colique et antibiotiques oraux avant chirurgie du cancer colique: un essai randomisé multicentrique en double aveugle »

- MK-1308A-008 -

« A Phase 2, Multicenter, Multi Arm, Study to Evaluate Pembrolizumab (MK-3475) or MK-1308A (Co-formulated Quavonlimab (MK-1308)/Pembrolizumab) in Participants With Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Cancer »

- PREPACOL 2-

« Préparation colique et antibiotiques oraux avant chirurgie du cancer du rectum: un essai randomisé multicentrique en double aveugle »



Pédiatrie

Pas de nouvelles études sur la période



Pneumologie



- DDRiver SCLC 250 / MS201923_0050 -

« A Phase II, Open-label, Single-arm Study of Berzosertib (M6620) in Combination With Topotecan in Participants With Relapsed Platinum-resistant Small-Cell Lung Cancer »

- ENCO-BRAF / IFCT-1904 -

« Etude de phase II évaluant l'inhibiteur de BRAF encorafenib en combinaison avec l'inhibiteur de MEK binimetinib chez des patients atteints d'un cancer non à petites cellules présentant une mutation BRAF V600E »

- MK7684A-002 -

« A Phase 2, Multi-center, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of MK-7684A or MK-7684A Plus Docetaxel Versus Docetaxel Monotherapy in the Treatment of Participants With Metastatic Non-small Cell Lung Cancer With Progressive Disease After Treatment With a Platinum Doublet Chemotherapy and Immunotherapy »

- PAPILLON / 61186372NSC3001 -

« A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Combination Amivantamab and Carboplatin-Pemetrexed Therapy, Compared With Carboplatin-Pemetrexed, in Patients With EGFR Exon 20ins Mutated Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer »

- Perla / 213403 -

« A Randomized, Phase 2, Double-blind Study to Evaluate the Efficacy of Dostarlimab Plus Chemotherapy Versus Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Metastatic Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer »



Sénologie



- DESTINY-Breast05 / DS8201-A-U305 -

« Etude de phase 3 multicentrique, randomisée, en ouvert, contrôlée par comparateur actif sur le trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab emtansine (T-DM1) chez des participants atteints d'un cancer du sein primaire HER2 positif à haut risque qui présentent une maladie invasive résiduelle dans le sein ou les ganglions lymphatiques axillaires après un traitement néoadjuvant»

- eMonarchHER / I3Y-MC-JPCW -

« eMonarchHER: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Abemaciclib Plus Standard Adjuvant Endocrine Therapy in Participants With High-Risk, Node-Positive, HR+, HER2+ Early Breast Cancer Who Have Completed Adjuvant HER2-Targeted Therapy »

- KATE3 / MO42319 -

« A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Study of the Efficacy and Safety of Trastuzumab Emtansine in Combination With Atezolizumab or Placebo in Patients With HER2-Positive and PD-L1-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer Who Have Received Prior Trastuzumab- (+/- Pertuzumab) and Taxane-Based Therapy »



Cancers de la prostate

- AMPLITUDE -

« Etude de phase 3 randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle évaluant l'efficacité et la tolérance du niraparib en combinaison avec l'acétate d'abiratéron et la prednisone versus l'acétate d'abiratéron et Prednisone pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec une lignée germinale délétère ou une mutation des gènes de réparation de la recombinaison homologue (HRR) »

- PRESTO / GETUG AFU 26 -

« Etude randomisée contrôlée de phase III évaluant l'efficacité de la radiothérapie stéréotaxique ablative tumorale chez les patients atteints de cancer de prostate oligométastatique hormonosensible »

- PROCADE / HC1119-CS-03 -

« PROCADE: A Multinational Phase 3, Randomized, Double-Blind, Non-inferiority, Efficacy and Safety Study of Oral HC-1119 Versus Enzalutamide in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) »

Cancers de la vessie

- BLAD-RAD01 -

« Etude prospective de phase II randomisée évaluant la radiothérapie de clôture chez des patients porteurs d'un carcinome urothélial de la vessie métastatique non progressifs et avec au plus trois lésions métastatiques résiduelles après traitement systémique de première ligne »



Autres localisations



- GERICO14 -

« Etude de phase III randomisée cyclophosphamide oral vs doxorubicine en 1ère ligne de chimiothérapie chez les patients âgés ≥ 65 ans atteints de sarcome des tissus mous métastatique ou avancé : Essai multicentrique »

- AGADIR -

« Etude de phase 2, évaluant l'efficacité de l'atézolizumab associé à des injections intratumorales de BDB001, un agoniste du récepteur Toll-like 7 et 8 (TLR7 et TLR8), et à une radiothérapie immunogénique, chez des patients ayant une tumeur solide avancée »

- OligoRARE / EORTC-1945 -

« Stereotactic Body Radiotherapy in Addition to Standard of Care Treatment in Patients With Rare Oligometastatic Cancers (OligoRARE): a Randomized, Phase 3, Open-label Trial »

- DF1001-001 -

« Etude de phase 1-2, évaluant la sécurité d'emploi, la tolérance, la pharmacocinétique et l'activité clinique et biologique du DF1001, chez des patients ayant des tumeurs solides avancées ou métastatiques, avec sélection de certaines indications lors de la phase d'extension »

⇒ **Mutation cible : HER2**

⇒ **Cancer localement avancé ou métastatique**

⇒ **$\geq 2^{\text{ème}}$ ligne de traitement**